



**Vacuna de Encefalomiелitis
Aviar-Viruela
Aviar-Laringotraqueitis
Virus Activo, Vector Activo de
Viruela Aviar**



FÓRMULA

Vectormune FP-LT+AE contiene un virus activo genéticamente modificado para la vacunación de gallinas reproductoras y de postura como una ayuda en la prevención de la Viruela Aviar y la Laringotraqueitis. La vacuna también contiene un virus activo convencional para ayudar en la prevención de la Encefalomiелitis Aviar.



INDICACIONES

Administrar por el pliegue del ala en gallinas reproductoras y de postura, saludables, susceptibles de 8 semanas de edad o más pero por lo menos 4 semanas antes del inicio de la postura como una ayuda en la prevención de Viruela, Laringotraqueitis y Encefalomiелitis aviar. Pollos que reciban esta vacuna no deben haber sido previamente vacunados con una vacuna de viruela aviar.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Punción en el pliegue del ala en gallinas reproductoras y ponedoras, 0.01 mL por ave.



ADVERTENCIAS

Almacenar entre 2-8°C. No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio. Utilizar todo el contenido inmediatamente después de la rehidratación.

Descartar el envase y contenido no utilizado de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



PRESENTACIÓN

500, 1000 y 2000 dosis.

