



Vacuna de Viruela Aviar- Laringotraqueitis Vector activo de Viruela Aviar



FÓRMULA

Vectormune FP LT contienen un virus activo genéticamente modificado para la vacunación en aves reproductoras, de engorda y postura como una ayuda en la prevención de la Viruela Aviar y Laringotraqueitis.



INDICACIONES

La vacuna se recomienda para su uso en pollos sanos de una semana de edad o mayores o en huevos embrionados de pollo de 18 días de edad, seguida de una re-vacunación a los 7 días de edad como ayuda en la prevención de Viruela y Laringotraqueitis.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

In ovo: en embriones de 18 días de edad, 0.05 - 0.1 mL por embrión.

Aves de 7 días de edad: 0.01 mL por pollo, en reproductoras, postura y engorda.



ADVERTENCIAS

Almacenar entre 2-8 °C. No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio. Utilizar todo el contenido inmediatamente después de la rehidratación.

Descartar este envase y todo contenido no utilizado de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



PRESENTACIÓN

2000 y 4000 dosis.

