



Vacuna contra la Enfermedad de Marek cepa HVT.



FÓRMULA

Cada dosis contiene:
Herpesvirus del serotipo 3 cepa FC-126 (HVT)
congelado y asociado a células para la prevención de la
enfermedad de Marek.



INDICACIONES

Se recomienda el uso de la vacuna en aves saludables
de un día de edad, o para vacunación *in ovo* en huevos
embrionados de 18 a 19 días de edad, como un auxiliar
en la prevención de la enfermedad de Marek. Se
recomiendan las buenas prácticas de manejo para
reducir la exposición al virus de la enfermedad de
Marek, durante por lo menos dos semanas posteriores a
la vacunación.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Determinar el volumen de dosis de la vacuna con el del
diluyente, así como la vía de administración como se
describe a continuación:

1. Para inyección subcutánea de aves de un día de
edad. Aplicar 0.2 mL por ave.
2. Para vacunación *in ovo* de embriones de pollo de
18 - 19 días de edad. Aplique una dosis completa en
cada huevo embrionado a partir de los 18 días
utilizando el equipo para la administración *in-ovo*.
La vacuna se aplica en el saco amniótico.



ADVERTENCIAS

1. Ampolletas conteniendo la vacuna: Almacenar en
nitrógeno líquido.
2. Diluyente: Almacenar a temperatura ambiente
entre 20 - 25 °C (68 - 77 °F).
3. Leer cuidadosamente las indicaciones anteriores.
4. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al
sacrificio.
5. Incinerar los envases y contenidos sin utilizar.
6. No remover la vacuna del nitrógeno líquido hasta
que esté listo para utilizarla.
7. No recongelar la vacuna.
8. No utilizar la vacuna que se ha descongelado
dentro del contenedor de nitrógeno líquido.
9. No sobre-dosificar o sobre-diluir la vacuna.
10. Conservar fuera del alcance de los niños y animales
domésticos.



PRESENTACIÓN

4000 dosis.

