



## **Vacuna activa congelada contra la enfermedad de Marek serotipos 1 (Rispens) y 3 (HVT).**



### **FÓRMULA**

Cada dosis contiene:  
Herpesvirus serotipo 1 Rispens y serotipo 3 cepa FC-126 (HVT) congelado y asociado a células para la prevención de la enfermedad de Marek.



### **INDICACIONES**

Se recomienda el uso de la vacuna en aves saludables (pollos) de un día de edad o para vacunación *in ovo* en huevos embrionados de 18 a 19 días de edad, como un auxiliar en la prevención de la enfermedad de Marek muy virulenta. Se recomiendan las buenas prácticas de manejo para reducir la exposición al virus de la enfermedad de Marek durante por lo menos dos semanas posteriores a la vacunación.



### **VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS**

Determinar el volumen de dosis de la vacuna con el del diluyente, así como la vía de administración como se describe a continuación:

1. Para inyección subcutánea en aves de 1 día; aplicar 0.2 mL por ave
2. Para vacunación aplique una dosis completa en cada huevo embrionado a partir de los 18 días utilizando el equipo para la administración *in-ovo*. La vacuna se aplica en el saco amniótico.



### **ADVERTENCIAS**

1. Ampolletas conteniendo la vacuna: Almacenar en nitrógeno líquido.
2. Diluyente: Almacenar a temperatura ambiente entre 20 - 25 °C (68 - 77 °F).
3. Leer cuidadosamente las instrucciones anteriores.
4. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.
5. Incinerar los envases y el contenido sin utilizar.
6. No remover la vacuna del nitrógeno líquido, hasta que haya sido preparada para su uso.
7. No recongelar la vacuna.
8. No utilizar la vacuna que se ha descongelado dentro del contenedor de nitrógeno líquido.
9. No sobre-dosificar o sobre-diluir la vacuna.
10. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



### **PRESENTACIÓN**

2000 dosis.

