



Para la inmunización activa en aves contra la enfermedad de Marek y la Influenza Aviar



FÓRMULA

VECTORMUNE® HVT AIV contiene antígenos contra el virus de la enfermedad de Marek, serotipo 3 y el virus de la influenza aviar tipo H5. El virus recombinante de HVT-AIV tiene un título por dosis ≥ 3020 UFP.



INDICACIONES

Se recomienda el uso de la vacuna en aves saludables (pollos) de un día de edad o para vacunación *in ovo* en huevos embrionados de 18 a 19 días de edad, como un auxiliar en la prevención de la influenza aviar, tipo H5 y de la enfermedad de Marek. Se recomiendan buenas prácticas de manejo para reducir la exposición al virus de la enfermedad de Marek y de la Influenza Aviar, durante por lo menos dos semanas posteriores a la vacunación.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Determinar el volumen de la dosis de la vacuna con el del diluyente, así como la vía de administración, como se describe a continuación:

1. Para inyección subcutánea en aves de un día de edad. Mezclar 200 mL de diluyente para cada 1000 dosis de vacuna y aplicar 0.2 mL por ave.
2. Para vacunación *in ovo* de embriones de pollo de 18 a 19 días de edad. Mezclar 100 mL de diluyente por cada 1000 dosis de vacuna para administrar 0.1 mL por embrión de pollo o mezclar 50 mL por cada 1000 dosis de vacuna para administrar 0.05 mL por embrión de pollo.



ADVERTENCIAS

1. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.
2. Incinerar los envases y el contenido sin utilizar.
3. No remover la vacuna del nitrógeno líquido hasta que haya sido preparada para su uso.
4. No recongelar la vacuna.
5. No utilizar la vacuna que se ha descongelado dentro del contenedor de nitrógeno líquido.
6. No sobre-dosificar o sobre-diluir la vacuna.
7. No se conoce el efecto de combinar esta vacuna con otros productos, lo que podría tener un impacto en su eficacia.
8. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



PRESENTACIÓN

4000 dosis.

