Vectormune® ND

Registro No. B-7378-132

Vacuna contra la Enfermedad de Marek y Enfermedad de Newcastle

FÓRMULA

VECTORMUNE® ND contiene el virus activo, genéticamente modificado de la enfermedad de Marek Serotipo 3 (Herpesvirus de pavo o HVT), cepa FC-126, con el gen F insertado (fusión) de la enfermedad de Newcastle (ND) cepa D26 lentogénica. El virus recombinante de rHVT/ND tiene un título por dosis ≥ 2500 UFP.

INDICACIONES

Se recomienda el uso de la vacuna por vía subcutánea en aves saludables (pollos) de un día de edad o para vacunación *in ovo* en huevos embrionados de 18 a 19 días de edad, como un auxiliar en la prevención de la enfermedad de Newcastle y la enfermedad de Marek. Se recomiendan buenas prácticas de manejo para reducir la exposición al virus de la enfermedad de Newcastle y la enfermedad de Marek, durante por lo menos dos semanas posteriores a la vacunación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

VECTORMUNE® ND debe ser administrada por la vía in ovo a embriones de pollo de 18 a 19 días de edad o por vía subcutánea en aves de un día de nacidos.

Administración *in ovo*
Aplicar una inyección de 0.05 ml a los embriones de pollo de 18 a 19 días de edad.

Administración subcutánea
Aplicar una inyección de 0.2 ml en la piel laxa del tercio medio dorsal del cuello en cada ave, en el primer día de edad.

ADVERTENCIAS

1. Una protección satisfactoria se logra únicamente vacunando aves saludables.
2. Todas las aves de la parvada deben ser vacunadas al mismo tiempo.
3. Utilizar todo el contenido de vacuna inmediatamente después de su dilución.
4. Evitar propagar la cepa de la vacuna a los pavos.
5. Desechar todos los contenedores abiertos después de la vacunación, siguiendo las regulaciones de las autoridades locales.
6. Un almacenamiento o manejo inapropiado de la vacuna puede resultar en la pérdida de su potencia.
7. No utilizar este producto durante el periodo de postura.
8. No sobre-dosificar o sobre-diluir la vacuna.
9. No se conoce el efecto de combinar esta vacuna con otros productos, lo que podría tener un impacto en su eficacia.
10. Conservar fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRESENTACIÓN

1000, 2000 y 4000 dosis.

Elaborado por:
Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Ceva Salud Animal, S.A. de C.V.
Ciudad de México

USO VETERINARIO • CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO • SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA